

ヌバキンビッド®筋注の接種を受けた方へ 接種した後にご注意いただきたいこと

ワクチン接種後15～30分程度は
安静にしてください。

予防接種を受けた直後から30分程度の間に、
急な副反応が起こる可能性があります。
このため、15～30分程度は接種医療機関の施設内等で
背もたれのある椅子に座るなど、
ゆったりとした気持ちでお待ちください。



公益社団法人日本薬剤師会：薬剤師から一般の方々に向けた新型コロナウイルスワクチンに関するFAQ [2024年6月閲覧]
<https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/activities/faq1024.pdf>

ワクチン接種後に起こる可能性がある副反応

ショックやアナフィラキシー

- 全身：冷汗が出る、ふらつき
- 顔面：顔面蒼白（そうはく）
- 胸部：動悸（どうき）、息苦しい
- 皮膚：全身のかゆみ、じんましん
- 頭部：めまい、意識の消失
- 口や喉：喉のかゆみ
- 手・足：手足が冷たくなる など

ワクチン接種による緊張や痛みをきっかけとした血管迷走神経反射

- 立ちくらみ
- 血の気がひく（時には気を失うこともある）

ヌバキンビッド患者向け医薬品ガイド（2024年3月更新）
https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ph/GUI/400256_631341GA1029_1_01G.pdf

医療機関を出た後でも、上記のような症状やいつもと違う体調の変化や
異常を感じた場合はすみやかに医師の診察を受けてください。

より詳しい情報はこちらのサイトをご確認ください。
https://www.go-beyond-covid-19.jp/patients_inoculation/



本ワクチン接種後は、副反応の発現に注意してください。

高熱やけいれん等の異常な症状があらわれた場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。

ワクチン接種日以降にあらわれるかもしれない副反応

注射部位反応

注射した場所の痛み・圧痛(押すと痛い)、腫れ、発赤(赤くなる)など

全身症状

頭痛、吐き気・おう吐、疲労、体がだるい、筋肉痛、関節痛、手足が痛い、悪寒、発熱など

ヌバキンビッド筋注 電子添文
ヌバキンビッド患者向け医薬品ガイド(2024年3月更新)
https://www.info.pmda.go.jp/downloadfiles/ph/GUI/400256_631341GA1029_1_01G.pdf

このほか、下記にもご注意ください。

- 注射した部分は清潔に保つようにしてください。また、注射した部分を強くこすらないようにしてください。
- 接種当日の入浴は可能ですが、体調がすぐれない場合は無理をせず様子をみてください。
- 接種当日の激しい運動や過度の飲酒は控えてください。



厚生労働省: 新型コロナワクチンQ&A [2024年6月閲覧]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html

医薬品副作用被害救済制度

予防接種法に基づく定期接種以外の予防接種(任意接種)によって健康被害(医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害)が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による被害救済の対象となります。健康被害の内容、程度等に応じて、薬事審議会(副作用・感染等被害判定部会)での審議を経た後、医療費、医療手当、障害年金等が支給されます。問い合わせ先は以下のとおりです。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 電話:0120-149-931(フリーダイヤル) URL:<https://www.pmda.go.jp>

医療機関名